AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN **TECHNIQUE** DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE X X24x numérosxpar an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17 et 9.57 COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-&-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DUON 3405.12 K

Additif au nº 130

2 JUILLET 1971

VIGNE

INFORMATION : BRENNER ou ROUGEOT PARASITAIRE : Cette maladie est en recrudescence : des manifestations extrêmement violentes mais localisées ont été observées dans divers vignobles de la Circonscription. Les feuilles présentent des taches internervaires, rouges sur cépages rouges, livides ou jaunâtres sur cépages blancs, avec un dessèchement sur le pourtour marginal.

La durée d'incubation du champignon est nettement plus longue que celle du mildiou, aussi les taches se manifestent tardivement. La détection des foyers de Brenner est importante pour la lutte à entreprendre. Celle-ci ne peut s'effectuer qu'au départ de la végétation (avant les traitements mildiou - En 1971 note du 16 Avril). L'influence des techniques culturales est indéniable. Eviter tout rognage intempestif. En outre, actuellement dans les vignes attaquées, appliquer les traitements anti-mildiou qui seront préconi-

Des rougissements dûs au rougeot physiologique ou à l'esca ne doivent pas être confondus avec ceux provoqués par le brenner.

ARBRES FRUITIERS

OIDIUM DU POPMIER: Eliminer les pousses oldiées et renouveler la protection. CARPOCAPSE DES POLETES ET DES POTRES : Renouveler le traitement.

POMES DE TERRE

MILDIOU: Les fortes précipitations des 25 et 26 Juin risquent de provoquer l'extension de la maladie. Effectuer un traitement soigné dès réception de notre bulletin.

BETTERAVES

PUCERONS : Malgré la belle végétation des betteraves, des dégâts sensibles peuvent être causés par les nombreuses colonies de pucerons noirs qui pourront encore se multiplier avec le retour d'un temps chaud. Appliquer un traitement aphicide selon l'importance et la généralisation des colonies de pucerons.

HOUBLONS

MILDIOU: Assurer la protection des pousses secondaires.

PUCERONS: La présence de très nombreux pucerons impose l'adjonction d'un produit aphicide à la bouillie anticryptogamique. Ne pas utiliser plusieurs années de suite le même produit, pour obtenir une meilleure efficacité.

Dernière note : Supplément nº 1 au bulletin 129.

Les Ingénieurs responsables des Avertissements Agricoles :

J. PSTIOT - H. TISSOT.

L'Ingénieur d'Agronomie, Chef de la Circonscription Phytosanitaire "Sourgogne et Franche-Comté" :

P348

the state of the s

 $\label{eq:constraints} \mathcal{L}_{\mathcal{A}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{$